

Storosios žarnos vėžys ankstyvose stadijose dažnai **nesukelia jokių simptomų.**

Labai svarbu tikrintis profilaktiškai – net jei jaučiatės visiškai sveiki.

Kaip dalyvauti programoje?

- ✓ Kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
- ✓ Bus atliktas slapto kraujavimo išmatose (iFOBT) testas.
- ✓ Jei testas teigiamas, gydytojas išduos siuntimą kolonoskopijai.
- ✓ Prireikus gali būti atliekama biopsija diagnozei patvirtinti.



Kilus papildomų klausimų apie programą, kviečiame kreiptis į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą.



Storosios žarnos vėžio prevencija



Visos programos paslaugos
NEMOKAMOS

MOTERIMS IR
VYRAMS
50–74 m.

Lietuvoje vykdoma storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa



50–74 m.
metų vyrams
ir moterims



Slapto kraujavimo
išmatose testas
atliekamas kartą per
2 metus.

Profilaktinė patikra padeda anksti nustatyti ligą ir gali išgelbėti gyvybę.

Kodėl verta pasitikrinti?

- ✓ Tyrimas padeda anksti nustatyti storosios žarnos vėžį ir ikivėžinius pakitimus.
- ✓ Anksti nustatčius ligą, gydymas būna daug veiksmingesnis.



Storosios žarnos vėžio galimi simptomai



- ✓ Tuštinimosi įpročių pokyčiai.
- ✓ Kraujas išmatose.
- ✓ Svorio kritimas.
- ✓ Nuovargis ir silpnumas.
- ✓ Nuolatinis diskomfortas pilve.
- ✓ Guzelis pilve arba išangėje.
- ✓ Anemija ir lėtinis nuovargis.
- ✓ Gleivės išmatose.
- ✓ Nepilno tuštinimosi pojūtis.
- ✓ Reguliarus skausmas ir pilvo pūtimas.



**Klauskite
savo šeimos
gydytojo jau
šiandien!**

Neignorruokite storosios žarnos vėžio simptomų – jų atpažinimas ir laiku atlikti tyrimai padeda ligą nustatyti anksti ir pasiekti geresnių gydymo rezultatų.